

登園を控えることが望ましい場合

こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン」より

発熱

- ★ 24 時間以内に **38℃以上の熱**がある場合
- ★ 解熱剤を使用している場合
- ★ 朝から **37.5℃を超えた熱**があることに加えて、元気がなく機嫌が悪い、食欲がなく朝食・水分が摂れていないなど **全身状態が不良**である場合

※ 例示した発熱時の体温はめやすです。子どもの **平熱に応じて個別に判断を**しましょう。



下痢

- ★ 24 時間以内に **複数回の水様便**がある
- ★ 食事や水分を摂るとその **刺激で下痢**をする
- ★ 下痢と同時に体温がいつもより高い
- ★ 朝に **排尿がない**
機嫌が悪く元気がない
顔色が悪くぐったりしている



嘔吐

- ★ 24 時間以内に **複数回の嘔吐**がある
- ★ 嘔吐と同時に体温がいつもより高い
- ★ **食欲がなく水分も欲しがらない**
機嫌が悪く元気がない
顔色が悪くぐったりしている

咳

- ★ 夜間しばしば **咳のために起きる**
- ★ **ゼイゼイ音、ヒューヒュー音や呼吸困難**がある
- ★ **呼吸が速い**
- ★ 少し **動いただけで咳**が出る



発しん

- ★ **発熱とともに発しん**がある
- ★ **感染症による発しん**が疑われ、医師より登園を控えるよう指示された
- ★ **口内炎がひどく食事や水分が摂れない**
- ★ 発しんが顔面等にあり、患部を覆えない
- ★ 滲出液が多く、他児への感染のおそれがある
- ★ **かゆみが強く手で患部を**かいてしまう



「保育所における感染症対策ガイドライン」の詳細はこちらでご確認ください。 QRコード→
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/cd6e454e/20231010_policies_hoiku_25.pdf



ご家庭でできる感染症予防

予防注射

予防注射により、感染症罹患の可能性を減らしたり、重症化しにくくしたりします。また、本人だけでなく、周囲の人を感染症から守ることにもつながります。

手洗い

感染は、病原体の付着した手で、口・鼻等を触ることで、体内に侵入して成立します。手洗いで手指を清潔に保つことが最も重要な感染症対策です。

