

带状疱疹疫苗任意预防接种费用部分补助通知

足立区

【接种前必读】

为预防带状疱疹发病及带状疱疹后神经痛（PHN），并减轻预防接种费用的经济负担，现对带状疱疹疫苗任意预防接种费用实施部分补助。请携带随附的预诊票前往足立区内指定医疗机构接种，并向医疗机构支付接种费用与区补助金额之间的差额。

无论是定期预防接种还是任意预防接种，可获得补助的机会**一生仅限一次**。

如选择享受本任意预防接种补助，则年满 65 周岁时将不可再获得“定期预防接种”补助。

对象人群

- 本区 50 周岁以上、未满 65 周岁的居民
- ※ 未曾利用过本制度者为适用对象。
- ※ 接种时间为自 50 周岁生日前一日至 65 周岁生日前一日。

接种期限

- 截至发放预诊票当年度的 3 月 31 日

补助金额及补助次数

- 在接种费用中，按疫苗种类由区承担以下金额。接种费用因医疗机构而异。（如全额自费接种：活疫苗约 9,000 日元/次，不活化疫苗约 22,000 日元/次）
 - 【活疫苗 (Biken)】 5,000 日元 1 次
 - 【不活化疫苗 (Shingrix)】 10,000 日元 最多 2 次
- ※ 如选择不活化疫苗，接种间隔原则上需在 2 个月以上。**请务必在发放预诊票年度的 1 月 31 日前完成第 1 次接种，否则将无法在规定期限内完成全部 2 次接种。**

实施地点

【区内指定医疗机构】

- 需提前预约。
- 在区内指定医疗机构以外接种的，不属于费用补助范围。
- 各医疗机构的接种费用及提供的疫苗种类可能不同，请事先确认。

需携带物品

- 可证明本人为足立区居民的证件（如个人编号保险证、驾驶证等）
- 带状疱疹疫苗任意预防接种预诊票
- ※ 如接种活疫苗，则无需进行第 2 次接种。如随附两份预诊票，仅使用标有“(任意)带状疱疹①”的一份，“(任意)带状疱疹②”请自行作废。
- 接种费用与补助金额之间的差额（具体费用请咨询医疗机构）

注意事项

- 不活化疫苗需间隔 2 个月接种 2 次。如第 2 次接种超过 2 个月，应最迟在第 1 次接种日起 6 个月内完成。
- 一旦接种一种疫苗，不可更换为另一种疫苗。
- 补助对象仅限活疫苗或不活化疫苗中的一种，且**一生仅可获得一次补助**。

致拟接种带状疱疹疫苗（活疫苗、不活化疫苗）的人士

1 带状疱疹的症状

带状疱疹是由过去感染水痘后潜伏于体内的水痘-带状疱疹病毒再激活所致。通常沿神经分布，在身体一侧呈带状出现伴有疼痛的水疱。其并发症之一为“带状疱疹后神经痛”，即皮疹消退后疼痛仍然持续，可能对日常生活造成影响。70 岁年龄段人群发病率最高。

2 接种注意事项

预防接种原则上应在身体状况良好时进行。如健康状况不佳，请在咨询平时就诊的医生后，再决定是否接种。此外，以下情形不适宜接种：

- ① 明显发热者（通常指体温超过 37.5℃）
- ② 明显患有严重急性疾病者
- ③ 曾因拟接种疫苗的成分发生过过敏性休克者
- ④ 明确患有免疫功能异常疾病，或正在接受免疫抑制治疗者

⑤ 医生判断不适宜接种的其他情况

	活疫苗 (冻干水痘减毒活疫苗)	不活化疫苗 (重组疫苗)
其他的不可接种人群	<ul style="list-style-type: none"> ○正在接受化疗或类固醇治疗者 ○免疫力低下者 (如 HIV 感染等) ○已确认怀孕者 ○曾因卡那霉素、红霉素抗生素发生过过敏反应者 	如不属于上述①至⑤情形, 无论免疫状态如何, 一般均可接种。
接种需注意人群	接受输血或γ球蛋白注射者, 应在治疗后间隔 3 个月以上接种; 接受大量γ球蛋白治疗者, 应在治疗后间隔 6 个月以上接种。	由于该疫苗需肌肉注射, 患有血小板减少症或凝血功能障碍者, 以及正在接受抗凝治疗者需谨慎接种。

※ 此外, 患有心血管疾病、肾脏疾病、肝脏疾病、血液疾病等基础疾病者, 曾在接种疫苗后 2 日内出现发热或全身性皮疹等过敏症状者, 有惊厥病史者, 被诊断为免疫缺陷者, 或近亲患有先天性免疫缺陷症者, 以及可能对带状疱疹疫苗 (活疫苗、不活化疫苗) 成分产生过敏反应者等, 无论接种哪种疫苗, 均需谨慎。

【女性注意事项】

妊娠中或可能妊娠的人员为活疫苗接种不适宜对象, 不得接种。请在分娩后或确认未妊娠后, 于适当时间接种。接种前请咨询接种医生。

此外, 接种后 2 个月内需避孕。

3 疫苗效果

	活疫苗 (冻干水痘减毒活疫苗)	不活化疫苗 (重组疫苗)
接种满 1 年时	约 60%的预防效果	90%以上的预防效果
接种满 5 年时	约 40%的预防效果	约 90%的预防效果
接种满 10 年时	-	约 70%的预防效果

※ 对并发症之一的带状疱疹后神经痛的预防效果, 据报告, 在接种满 3 年时, 活疫苗约为 60%, 不活化疫苗为 90%以上。

4 疫苗的安全性

接种疫苗后可能出现以下副反应。此外, 虽发生率尚不明确, 但活疫苗可能出现过敏性休克、血小板减少性紫癜、无菌性脑膜炎; 不活化疫苗可能出现休克、过敏性休克、吉兰-巴雷综合征。

如在接种后出现异常症状, 请及时联系接种该疫苗的医疗机构。

主要副反应发生比例	活疫苗 (冻干水痘减毒活疫苗)	不活化疫苗 (重组疫苗)
70%以上	-	注射部位疼痛
30%以上	注射部位发红	注射部位发红、肌肉疼痛、疲劳
10%以上	注射部位瘙痒、灼热、肿胀、疼痛、硬结	注射部位肿胀、胃肠不适、寒战、发热
1%以上	皮疹、倦怠感	瘙痒、倦怠感、全身疼痛

5 接种后注意事项

- ① 接种后 30 分钟内可能出现急性副反应, 请确保能够及时与医疗机构取得联系。
- ② 请保持接种部位清洁。当日可入浴, 但请避免用力揉搓注射部位, 并避免剧烈运动及过量饮酒。

6 与其他疫苗的同时接种及接种间隔

无论哪种带状疱疹疫苗, 在医生认为必要的情况下, 可与流感疫苗、新型冠状病毒疫苗、老年人肺炎球菌疫苗等同时接种。

但活疫苗需与其他活疫苗间隔 27 日以上。

7 关于预防接种健康损害救济制度

如因任意预防接种导致健康损害, 可能适用独立行政法人医药品医疗器械综合机构的“医药品副作用损害救济制度”。

◆ 咨询方式 ◆

问询电话足立 03 - 3880 - 0039 每日上午 8 点至晚上 8 点 (1 月 1 日至 3 日除外)

足立区 保健预防课 预防接种系 TEL 03 - 3880 - 5094